

IMAGING DEPARTMENT  
(310) 514-5245

ORAL CONTRAST ORDER: 2- Bottles READICAT

The patient identified below has been scheduled for a CT Scan of the Abdomen and/or Pelvis study, which requires oral contrast. Please dispense 2-Bottles of Readicat to the patient and review instructions listed below.

Ordering Physician \_\_\_\_\_

Appointment Date: \_\_\_\_\_ Admitting Time: \_\_\_\_\_

Patient's Name: \_\_\_\_\_

**Patient should go to the Pharmacy Department to pick up contrast- READICAT.**

The night before your scheduled exam you may have a light meal. **Light Meal** includes: clear soups (fat-free), small portions of skinless chicken, or turkey, fish, plus clear liquids and clear jello (no red, green or purple). **DO NOT EAT** fruits, vegetables, milk, cheese, pork, or whole grain cereals.

**APPOINTMENT TIME:**

**BETWEEN 7 AM.-12PM (NOON)**

You will be given two bottles of oral contrast. You will drink one bottle the night before your exam (just before you go to sleep). No Solid Food after you drink the first bottle. You may have clear liquids (broth, clear jello, clear juices, coffee-no cream) up to 4 hrs. prior to appt. Nothing to eat or drink after \_\_\_\_\_ **a.m./p.m.** the day of your appointment. You should drink ½ of the second bottle \_\_\_\_\_ **a.m./p.m.** (2 hrs. prior to your scheduled appointment).

When you arrive to the Radiology Department the CT Technologist will have you drink the remaining ½ of the bottle. **Note: You may refrigerate the bottle, it will taste better cold. Shake the bottle before drinking.**

**APPOINTMENT TIME BETWEEN 12PM-5PM:**

You will drink your first bottle \_\_\_\_\_ (6 hours before your scheduled exam). No Solid Food after you drink the first bottle. You may have clear liquids (broth, clear jello, clear juices, coffee-no cream) up to 4 hrs. prior to your appt. Nothing to eat or drink \_\_\_\_\_ **a.m./p.m.** the day of your appointment. You should drink ½ of the second bottle \_\_\_\_\_ **a.m./p.m.** (2 hrs. prior to your scheduled appointment).

When you arrive to the Radiology Department the CT Technologist will have you drink the remaining ½ of the bottle. **Note: You may refrigerate the bottle, it will taste better cold. Shake the bottle before drinking.**

**Note: We will need you to bring a list of all medications you are currently taking to your appointment.**

*If you are diabetic and taking the following medication, please notify us immediately. For some exams you must be off your medication for 48 hours after the exam.*

*Glucophage ( Metformin)*

*Metaglip ( Glipizide/Metformin)*

*Glucovance (Glyburide/Metaformin)*

*Avandamet ( Rosiglitazone/Metformin)*

 **PROVIDENCE**  
Little Company of Mary  
Medical Center  
San Pedro

DEPARTAMENTO DE LA PROYECCIÓN DE IMAGEN  
(310) 514-5245

ORDEN PARA EL CONTRASTE ORAL:

2 botellas de READICAT

El paciente identificado abajo esta citado/a para una tomografía del estudio del abdomen y/o de la pelvis, que requiere contraste oral. Dispense por favor 2-Botellas de Readicat a el/la paciente y revise las instrucciones enumeradas abajo.

Ordering Physician \_\_\_\_\_

Fecha de la cita: \_\_\_\_\_ Horario de Registracion: \_\_\_\_\_

Nombre del paciente: \_\_\_\_\_

**El paciente debe ir a la farmacia a recoger el contraste READICAT.**

La noche antes de su cita usted puede comer una comida ligera. **Comida ligera** incluye: sopas claras (sin grasa), porciones pequeñas del pollo o pavo sin piel, pescados, líquidos claros y gelatina clara (rojo, verde o morada). NO COMA frutas, vegetales, leche, queso, puerco, o cereales integrales.

**HORARIO DE CITA:**

**ENTRE 7AM - 12PM (MEDIODÍA)**

Le darán dos botellas de contraste oral. Usted debe tomar una botella la noche antes de su examen (justo antes de que usted va a dormir). Ningún alimento sólido después de tomar la primera botella. Usted puede tomar líquidos claro (caldo, gelatina clara, jugos claros, café-sin crema) hasta 4 horas antes su cita. Nada de comer o beber después de la(s) \_\_\_\_\_ am/pm el día de su cita. Usted debe tomar la ½ de la segunda botella a la(s) \_\_\_\_\_ am./pm (2 horas antes de su cita). Cuando usted llega al departamento de la radiología el tecnólogo de tomografía le dirá que tome la otra ½ de la botella.

***Nota: Usted puede refrigerar la botella, el sabor será mejora frío. Agite la botella antes de beber.***

**HORARIO DE CITA:**

**ENTRE 12PM-5PM:**

Usted debe tomar su primera botella a la(a) \_\_\_\_\_ am/pm (6 horas antes de su cita). Ningún alimento sólido después de tomar la primera botella. Usted puede tomar líquidos claros (caldo, gelatina clara, jugos claros, café-sin crema) hasta 4 horas antes de su cita. Nada de comer o beber después de la(s) \_\_\_\_\_ am/pm el día de su cita. Usted debe tomar la ½ de la segunda botella a la(s) \_\_\_\_\_ am/pm (2 horas antes de su cita). Cuando usted llega al departamento de la radiología el tecnólogo de tomografía le dirá que tome la otra ½ de la botella.

***Nota: Usted puede refrigerar la botella, el sabor será mejora frío. Agite la botella antes de beber.***

***Nota: Necesitará traer una lista de todas las medicaciones que usted está tomando actualmente a su cita. Si usted es diabético y toma la medicación siguiente, notifiquennos por favor inmediatamente. Para algunos exámenes usted debe parar su medicación por 48 horas después del examen.***

***Glucophage (Metformin)***

***Metaglip ( Glipizide/Metformin)***

***Glucovance (Glyburide/Metaformin)***

***Avandamet ( Rosiglitazone/Metformin)***

